

# TRATAMIENTO MICROQUIRÚRGICO DE ANEURISMAS PARACLINOIDEOS


## PRESENTACIÓN DE UN CASO







Molés Pérez P.; Broseta Blasco J.; García Oriola G.;  
Peris Fuertes X.; Quilis Quesada V.

HOSPITAL CLÍNIC UNIVERSITARI DE VALÈNCIA



# CLASIFICACIÓN





**SUPERIORES**

**INFERIORES**

**LATERALES**

**MEDIALES**

# ANATOMÍA REGIONAL





































TRATAMIENTO



- Problema relevante en Neurocirugía:




VS



Punto de debate claro...  
**¿CUÁL DEBEMOS ELEGIR?**

- Problema relevante en Neurocirugía:



- FACTORES:

1. **Afectación visual**
2. Tamaño y localización
3. Edad del paciente
4. **Anatomía regional**



**ANÁLISIS GLOBAL  
+  
INDIVIDUALIZACIÓN**



NUESTRO CASO

# Paciente de sexo femenino de 48 años

- ANTECEDENTES:

- Fumadora activa
- Espondilitis anquilosante
- Enfermedad de Crohn

- EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA


- No aparente focalidad
- **IMPORTANCIA DE LA AFECTACIÓN VISUAL**













# RESULTADOS












PREVIA 8/11/2024



POSTERIOR 13/01/2025



CONCLUSIONES



1. El conocimiento de la anatomía microquirúrgica nos permite alcanzar con seguridad el clipaje de los aneurismas paraclinoideos. La disección 360° del anillo dural distal resulta imperativa.
2. Resulta clave la realización rigurosa de cada uno de los pasos previo clipaje.
3. La durabilidad del tratamiento, la edad del paciente y la compresión de la vía visual son factores a tener en cuenta cuando se decide el manejo de esta patología.





MUCHAS GRACIAS