


Edema masivo contralateral tras craneoplastia diferida

Casos clínicos, factores de riesgo y lecciones aprendidas.

Luis Bautista Miñano




Craneoplastia



Craneoplastia

Objetivos

- Proteger las estructuras cerebrales.
- Restablecer la forma del craneo (fines estéticos).
- Mejorar flujo sanguíneo y regulación de la PIC.



Craneoplastia

Complicaciones

Craneoplastia

Complicaciones

Tempranas

Tardías

Craneoplastia

Complicaciones

Tempranas

Tardías



Craneoplastia

Complicaciones

Tempranas

Tardías




Craneoplastia

Complicaciones

Tempranas

Tardías



Craneoplastia

Complicaciones

Tempranas

Tardías




Craneoplastia

Complicaciones

Tempranas




Tardías



Hundimiento del colgajo

Sd. Trefinado vs Sinking skin flap syndrome.



Hundimiento del colgajo

Sd. Trefinado vs Sinking skin flap syndrome.

- Síndrome del Trefinado:
 - Síntomas inespecíficos tras la craniectomía: cefalea, mareos, molestias región quirúrgica.
- Síndrome del colgajo cutáneo hundido:
 - Mejoría inicial.
Empeoramiento posterior.
 - Puede aparecer nueva focalidad.

Edema masivo contralateral tras craneoplastia diferida

**Casos
clínicos**

Caso 1

♀44; HSA; Aneurisma basilar y ACM izquierda.


Caso 1

♀44; HSA; Aneurisma basilar y ACM izquierda.




Caso 1

♀44; HSA; Aneurisma basilar y ACM izquierda.



Caso 1

♀44; HSA; Aneurisma basilar y ACM izquierda.




Caso 1

♀44; HSA; Aneurisma basilar y ACM izquierda. Craniectomía descomp.



Caso 1

♀44; HSA; Aneurisma basilar y ACM izquierda. Craniectomía descomp.




Caso 2

Caso 2

♀43; HSA; Aneurisma comP izquierda. Craniectomía descompresiva


Caso 2

♀43; HSA; Aneurisma comP izquierda. Craniectomía descompresiva




Caso 2

♀43; HSA; Aneurisma comP izquierda. Craniectomía descompresiva




Caso 2

♀43; HSA; Aneurisma comP izquierda. Craniectomía descompresiva



Edema masivo contralateral post-craneop.

Resumen



**No subestimemos la vigilancia postquirúrgica:
es el puente entre la cirugía y la recuperación**

